

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÂY THỨC ĂN VÀ ĐỒNG CỎ TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN

Dinh Văn Cải và Nguyễn Thị Thủy

¹Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn

Tác giả liên hệ: Dinh Văn Cải; Email: caidinhvan@gmail.com; Tel: 0903730420.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn ngày nay, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu trâu và đồng cỏ Sông Bé. Trung tâm được xây dựng năm 1977, trên một vùng đất hoang, rừng thứ sinh xen lẫn những vạt lô ô và le rậm rạp, nằm cách thị xã Bến Cát khoảng 10km hướng Quốc lộ 13 đi Bình Phước. Địa hình rộng lớn liền khoảnh, dốc vừa và tương đối bằng phẳng nên khả năng thoát nước nhanh.

Thời tiết ở đây có 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Số liệu thời tiết, khí hậu thống kê qua nhiều năm cho thấy: Nhiệt độ trung bình năm 28,6°C và thay đổi theo các tháng trong năm. Cao nhất vào tháng 3 và 4 (trung bình 31,3°C, ngày cao nhất lên tới 41°C). Thấp nhất vào tháng 12 và tháng 1 (trung bình 26,6°C). Độ ẩm trung bình năm 82,4% (dao động 79-85%). Lượng mưa trung bình năm 1684mm. Có sự khác biệt lớn về lượng mưa giữa các tháng trong năm. Mùa mưa, lượng mưa tập trung vào các tháng 6 và 7 (300-320mm), những trận mưa có vũ lượng lớn nhưng không kéo dài. Mùa khô, lượng mưa rất thấp, thấp nhất vào tháng 1 và 2 (3-4mm). Vào mùa khô, cây cỏ thiếu nước, chậm hoặc ngừng phát triển, bãi chăn thả khô héo, thường xảy ra tình trạng cháy đồng cỏ, cháy rừng. Đặc điểm thời tiết là một trở ngại lớn đối với việc cơ khí hóa trong sản xuất, bảo quản dự trữ thức ăn thô xanh quanh năm cho đàn gia súc.